



FICHA TÉCNICA

Código: MCA-LCA-25

Fecha de actualización: 03.01.25 Aprobado por calidad

DESCRIPCIÓN:

MICRO-LCA, es un bioinoculante utilizado como controlador biológico de insectos plaga de las plantas como "moscas blancas", "pulgones" y "trips". Siendo también antagónico para algunas enfermedades como la roya.

MODO DE ACCIÓN:

Por contacto, las esporas de las cepas nativas de Lecanicillium lecanii se adhieren y penetran a la cutícula de los insectos con ayuda de enzimas que produce el hongo (lipasas, kitinasas y proteasas) que descomponen el tejido y facilitan la penetración de la espora, provocando en el insecto la pérdida de sensibilidad, descoordinación de movimientos, obstrucción mecánica de los conductos respiratorios, agotamiento de las reservas, interrupción de los órganos y finalmente la muerte.

RECOMENDACIÓN DE USO:

Las recomendaciones de uso (dosificación y frecuencia) se establecen de acuerdo a las necesidades y especificaciones técnicas de cada cultivo. Se sugiere consultar con un Ingeniero Agrónomo.

MICRO-LCA

(Bioinoculante)

INGREDIENTES ACTIVOS:

Lecanicillium lecanii : 1 x 10° UFC/mL
Activador energético : c.s.p. 1 L

FORMULACIÓN:

Suspensión concentrada

CLASE DE USO:

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS:

- Densidad: aprox. 1.080 g/mL
- pH: **4.0 5.0**
- Estado físico: Líquido
- Color: Blanco lechoso
- Olor: Característico
- Corrosividad: No corrosivo
- Explosividad: No explosivo

 Estabilidad en almacenamiento:
Mantener el producto en un lugar fresco y seco, preferentemente a temperaturas menores a 25°C.

CUADRO DE USOS:

PRESENTACIÓN:

1L, 5L, 20L

Cultivos	Nombre de la plaga		Dosis foliar		PC (días)	
	N. Común	N. Científico	L/Cil	L/Ha	(días)	LMR
Frutales: Árandano, durazno, manzano, palto, limón sutil, limón tahití, pitahaya, vid frambueza, maracuya, fresa, papaya, banano, mango, granado y citricos	Mosca blanca	Bemisia tabaci	0.5-1.0	3.0-6.0		N/A
	Queresas	Hemiberlesia neodiffinis				
	Trips	Frankliniella occidentalis Thrips tabaci				
Granos y cereales: choclo, maíz arroz	Mosca blanca	Bemisia tabaci, Aleurodicus cocois	0.5-1.0	3.0-6.0		
Verduras y Hortalizas: cebolla, esparrago, capsicum	Arañita roja	Tetranychus urticae	0.5-1.0	2.0-4.0	0	
	Trips	Frankliniella occidentalis Thrips tabaci				
Leguminosas, tubérculos y algodón	Mosca blanca	Bemisia tabaci, Aleurodicus cocois	0.5-1.0	3.0-6.0		
Café	Roya amarilla	Hemileia vastatrix	0.5-1.0	3.0-6.0		

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos N.A.: No aplica



